


FAMILLE : ORCHIDACEES

GENRE : EPIPACTIS


797. *Epipactis* Zinn — *Epipactis*

- 1. F. plus courtes que l'entre-nœud correspondant; fl. larges de 2-3 mm; épichile orné de 3 crêtes.
E. microphylla (Ehrh.) Sw., é à petites feuilles — 2, G. 15-40 cm. Pl. lavée de pourpre; f. oblongues-lancéolées; tép. verdâtres, bordés de pourpre; ov. densément pubescent — 6-8 — Coll.-Mont.-(Subalp.); forêts (plutôt thermophile); préfère le calcaire. Rare. S.-Eur. — 679.
 — F. plus longues que l'entre-nœud correspondant; fl. larges de 4 mm au moins; épichile ne présentant pas ces caractères 2
- 2. Epichile obtus, à marge ondulée, séparé de l'hypochile par un étranglement très marqué
E. palustris (L.) Crantz, é des marais — 2, G. 30-50 cm. F. oblongues-lancéolées; fl. penchées; tép. ext. vert-brunâtre, les int. blancs; labelle strié de jaune ou de pourpre — 6-7 — Coll.-Mont.-(Subalp.); prés humides, marais; préfère le calcaire. Peu fréquent. Eurasiat. — 678.
 — Epichile aigu, la base large fixée sur l'hypochile 3
- 3. Epichile plus long que large, ordmt pointé vers l'avant.
E. leptochila (Godfery) Godfery, é à labelle étroit — 2, G. 30-60 cm. Infloresc. lâche, pendante; hypochile cupuliforme, rougeâtre à l'int.; épichile blanc ou blanc-verdâtre; anthère nettement stipitée; rostellum absent ou rudimentaire — 7-8 — Coll.-Mont.-(Subalp.); forêts, buissons (plutôt thermophile). Rare. Eur.
 — Epichile moins long à aussi long que large, plus ou moins fortement recourbé vers l'arrière 4
- 4. F. largement ovales, 2-3 fois plus longues que l'entre-nœud correspondant.
E. helleborine (L.) Crantz (*E. latifolia* (L.) Druce), é helleborine, é à larges feuilles — 2, G. 20-60 cm. Infloresc. lâche; épichile muni de 2 gibbosités lisses; ov. glabre — 7-8 — Coll.-Subalp.; forêts; préfère le calcaire. Fréquent. Eurasiat. — 681.
 — F. ovales-lancéolées à étroitement lancéolées, 1,5 fois plus longues que l'entre-nœud correspondant 5
- 5. Ov. densément pubescent.
E. atrorubens (Hoffm.) Besser (*E. atrorubens* auct.), é pourpre noirâtre — 2, G. 20-60 cm. Tige lavée de pourpre supmt; infloresc. dense; fl. brun pourpre; épichile muni de 2 gibbosités plissées-crispées — 6-8 — Coll.-Subalp.; forêts, prés, éboulis (plutôt xérophile); préfère le calcaire. Fréquent. Eurasiat. — 680.
 — Ov. glabre ou glabrescent 6
- 6. Pl. vert-jaunâtre; rostellum absent.
E. muelleri Godfery, é de Mueller — 2, G. 20-80 cm. F. lancéolées, à bord ondulé, formant une gouttière, vert-jaunâtre; infloresc. demicylindrique, à fl. pendantes, vert-jaunâtre — 6-8 — Coll.-Subalp.; forêts, buissons, prés (plutôt xérophile); calcaire. Rare. Eur.
 — Pl. lavée de violet; rostellum présent.
E. purpurata Smith, é pourpre — 2, G. 20-60 cm. Infloresc. dense, fortement papilleuse, rude; tép. int. blancs ou blanc-verdâtre; épichile muni de 2 gibbosités crénelées — 8-9 — Coll.-Mont.; forêts, lisières (plutôt thermophile); préfère le calcaire. Peu fréquent. Eur. — 682.


FEUILLES LANCEOLEES A OBLONGUES-OVALES
 TIGE PLURIFLORE
 LABELLE SANS EPERON ET ARTICULE TRANSVERSALEMENT
 OVAIRE PEDICELLE




E. MICROPHYLLA




E. PALUSTRIS




E. LEPTOCHILA




E. HELLEBORINE



E. ATRORUBENS



E. MUELLERI



E. PURPURATA