





<i>Erable sycomore</i>		<p><b>fleurs</b> : avril-mai (avec les feuilles), verdâtres, en grappes allongées pendantes  <b>feuilles</b> : mates et vert blanchâtre dessous, à 5 lobes triangulaires à dents inégales, séparés par des sinus profonds et très étroits  <b>samares</b> : 2-3,5 cm, double, à angle plus ou moins obtus-arrondi  <b>bourgeons</b> : ovale pointus, écailles vertes bordées de cils blancs  <b>particularités</b> : écorce des arbres âgés se disquamant; jusqu'à 1800 m d'altitude</p>
<i>Erable plane</i>		<p><b>fleurs</b> : avril (avant les feuilles), jaune verdâtre, en corymbes dressés  <b>feuilles</b> : assez minces, vert clair et luisantes dessous, à 5 lobes acuminés, à dents aiguës, séparés par des sinus arrondis et ouverts  <b>samares</b> : 4-5 cm, doubles, formant un angle largement obtus  <b>bourgeons</b> : ovoïdes-obtus, écailles rouge vineux bordées de cils clairs  <b>particularités</b> : écorce fissurée en longueur; jusqu'à 1500 m d'altitude</p>
<i>Erable champêtre</i>		<p><b>fleurs</b> : mai (avec les feuilles), verdâtres, sépales et pétales velus, en corymbes dressés,  <b>feuilles</b> : assez petites, à long pétiole, vertes, parfois pubescentes et plus claires dessous, à 3-5 lobes obtus, entiers ou à 2 grosses dents  <b>samares</b> : doubles, formant un angle de 180 degrés  <b>bourgeons</b> : petits, écailles brunes, velues, souvent marquées d'un trait noir transversal  <b>particularités</b> : croissance lente; rameaux à crêtes liégeuse plus ou moins prononcées</p>
<i>E. à fe. d'obier</i>		<p><b>fleurs</b> : avril (avant les feuilles, à observer aux Rapilles de Baulmes), jaune pâle verdâtre, en corymbes pendants  <b>feuilles</b> : un peu fermes, légèrement glauques et plus ou moins duveteuses dessous, à 5 lobes obtus, les inférieurs peu marqués  <b>samares</b> : doubles, formant un angle aigu  <b>bourgeons</b> : allongés-pointus, écailles brun clair bordées de brun foncé et souvent de cils blancs  <b>particularités</b> : espèce xérothermophile surtout présente au Jura, Chablais et vallée du Rhône</p>

Et surtout, n'allez pas confondre nos Erables avec les Platanes, à l'écorce d'abord grisâtre puis bariolée de vert et de jaune et s'exfoliant en plaques minces (rhytidomes) et aux fleurs et aux fruits (akènes plumeux) groupés en boules longuement pédonculées!



Henri CEPPI