


Un peu de détermination...


***Reconnaissance simplifiée de
64 «feuillus» plus ou moins
fréquents dans le district JNV***

Critères de base :


feuilles simples



feuilles composées



feuilles opposées



feuilles alternes

feuilles simples entières ou dentées



feuilles simples découpées



Classification :

A		fe simples opposées entières ou dentées
B		fe simples opposées découpées
C		fe simples alternes entières ou dentées
D		fe simples alternes découpées
E		fe composées opposées
F		fe composées alternes

A




Chèvrefeuille des haies
Ch.à balai, Camérisier, Blanchette
Lonicera xylosteum
 fam. Caprifoliacées
 (FH 1981)



fe ovales (2-5 cm) courtement pétiolées, molles, velues ; **fl** géminées blanches à jaunâtres, longuement pédicellées ; **fr** (baies) rouges et luisants, soudés à la base (toxiques)




Chèvrefeuille noir
Lonicera nigra
 fam. Caprifoliacées
 (FH 1982)



fe elliptiques (2-7 cm) courtement pétiolées (2-7 cm), glabres ; **fl** géminées blanches, lavées de rose, longuement pédicellées ; **fr** (baies) noir bleuâtre, soudés par 2 à la base (suspects)




Chèvrefeuille des Alpes
Lonicera alpigena
 fam. Caprifoliacées
 (FH 1983)



fe ovales-oblongues pointues (4-11 cm), luisantes dessous ; **fl** géminées rouge brunâtre, jaunes à la base, longuement pédicellées ; **fr** (baies) rouges, totalement soudés en forme de cerise (suspects)




Chèvrefeuille bleu
Lonicera caerulea
 fam. Caprifoliacées
 (FH 1984)



fe ovales-obtuses (2-5 cm), courtement pétiolées, molles ; **fl** en cloche, blanc jaunâtre, brièvement pédicellées ; **fr** (baies) bleus pruneux, totalement soudés par 2 (suspects)




Cornouiller sanguin
Cornus sanguinea
 fam. Cornacées
 (FH 1293)



ra vert-rougeâtre en été, puis pourpre foncé en automne et en hiver ; **fe** ovales (5-8 cm) ; **fl** blanc crème à 4 pétales étroits, en corymbes terminaux ; **fr** (drupes) noir bleuâtre, amers (non comest.)



Fusain d'Europe, Bois carré
Bonnet de prêtre
Euonymus (Evo.) europaeus
 fam. Célastracées
 (FH 1331)



fe lancéolées (4-6 cm), finement denticulées, vert mat ; **fl** à 4 pétales vert blanchâtre ; **fr** (capsules) ± rouges, à 4 loges et 4 graines entourées d'un arille orangé (suspects)



Troène, Frézillon
Ligustrum vulgare
 fam. Oléacées
 (FH 1732)



fe ± ovales-lancéol. (2-5 cm), luisantes, glabres, coriaces ; **fl** blanches, odorantes, en grappes terminales pyramidales ; **fr** (drupes à 2 noyaux) noirs, persistants, amers (toxiques)



Viorne lantane
Mancienne
Viburnum lantana
 fam. Caprifoliacées
 (FH 1973)




ra tomenteux (jeunes), à poils étoilés ; **fe** ovales (8-12 cm), épaisses, rugueuses ; **fl** blanches en corymbes, malodorantes ; **fr** (baies ou drupes à 1 noyau ?) ovoïdes, rouges puis noirs (suspects)


B




Erable à feuilles d'obier
Acer opalus
 fam. Acéracées
 (FH 1364)















fe à 5 lobes obtus, dont 2 parfois peu marqués, à sinus ± arrondis ; **fl** jaune pâle verdâtre (avant les fe) en corymbes pendants ; **fr** (akènes) ailés, réunis par 2 (disamares) et formant un angle aigu









	Erable champêtre <i>Acer campestre</i> fam. Acéracées (FH 1363)		ra (jeunes) à crêtes liégeuses ± prononcées ; fe assez petites, à 5 lobes obtus ; fl verdâtres, velues, en corymbes dressés ; fr (akènes) ailés, réunis par 2 (disamares) horizontalement
	Erable plane <i>Acer platanoides</i> fam. Acéracées (FH 1362)		fe à 5 lobes aigus, ± acuminés, à sinus larges, arrondis ; fl verdâtres (avant les feuilles) en corymbes dressés ; fr (akènes) ailés, réunis par 2 (disamares) et formant un angle largement obtus
	Erable sycomore E. des montagnes <i>Acer pseudoplatanus</i> fam. Acéracées (FH 1361)		fe à 5 lobes peu aigus, ± dentés, à sinus larges, arrondis ; fl verdâtres, en grappes allongées pendantes ; fr (akène) ailés, réunis par 2 (disamares) et formant un angle ± arrondi
	Viorne obier Boule-de-neige <i>Viburnum opulus</i> fam. Caprifoliacées (FH 1974)		fe à 3-5 lobes irréguliers, sinués-dentés ; fl blanches en corymbes ombelliformes, les intérieures fertiles, les extérieures stériles, à grands pétales : fr (drupes) rouges, persistant longtemps (toxiques)












C
↓



	Alisier blanc Alouchier, Allier <i>Sorbus aria</i> fam. Rosacées (FH 1049)		fe ovales (8-14 cm), irrégulièrement dentées, tomenteuses blanches dessous ; fl blanches en corymbes ; fr (piridions) orangés à rouges (alises, cornes, sorbes, comestibles)
	Alisier de Mougeot <i>Sorbus mougeotii</i> fam. Rosacées (FH 1051)		fe ovales (8-14 cm), doublemt dentées (incisées-lobées), tomenteuses grisâtres dessous ; fl blanches en corymbes ; fr (piridions) rouge corail (comestibles, à saveur acidulée)
	Alisier nain Sorbier petit néflier <i>Sorbus chamaemespilus</i> fam. Rosacées (FH 1046)		ra verruqueux ; fe ovales-allongées (5-10 cm), groupées autour des inflorescences ; fl roses à rouges en corymbes, calice cotonneux ; fr (piridions) rougeâtres ou brunâtres à maturité (comestibl.)
	Aulne (Aune) blanc Aulne de montagne <i>Alnus incana</i> fam. Bétulacées (FH 258)		fe ovales, aigües, 8-12 paires de nervures ; fl mâles en chatons pendants, femelles en petits cônes (esp. monoïque) ; fr (akènes) étroitement ailés, dans un cône ligneux sessile, svt appelé strobile
	Aulne (Aune) glutineux Verne <i>Alnus glutinosa</i> fam. Bétulacées (FH 257)		fe suborbiculaires, tronquées, à 4-8 paires de nervures latérales ; fl mâles en chatons pendants, femelles en petits cônes ; fr (akènes) étroitement ailé, dans un petit cône ligneux pédonculé (strobile)
	Bois gentil Bois joli <i>Daphne mezereum</i> fam. Thyméléacées (FH 1261)		fe lancéolées, obtuses, molles, groupées au sommet des rameaux ; fl rose pourpre à 4 pétales, apparaissant avant les feuilles ; fr (drupes) écarlates, luisants (très toxiques, même mortels)


	Bouleau pendante Bouleau verruqueux, B. blanc <i>Betula pendula, B. verrucosa</i> fam. Bétulacées (FH 253) 	éc lisse et blanche puis crevassée noirâtre ; fe triangulaires, glabres ; fl mâles en chatons pendants (8-10 cm), femelles en chatons dressés (3 cm) ; fr (akènes) largement ailés, sous 1 écaille triangulaire
	Bourdaine Aulne noir <i>Frangula alnus</i> fam. Rhamnacees (FH 1341) 	éc externe brun noir, interne verte ; fe ovales-elliptiques, apiculées, 7-10 paires de nervures arquées ; fl blanc verdâtre, isolées ou groupées ; fr (drupes) rouges puis noirs, à 2(3) noyaux (suspects)
	Cerisier sauvage Merisier <i>Prunus avium</i> fam. Rosacées (FH 1071) 	éc brun rouge s'exfoliant en lanières horizontales, fe ovales-lancéolées, pétiole muni de 2 glandes nectarifères rouges ; fl blanches en bouquets ; fr (drupes) rouges puis noirs (comestibles)
	Charme Charmille <i>Carpinus betulus</i> fam. Corylacées (FH 261) 	tr cannelé ; fe ovales pointues, d'aspect gaufré ; fl mâles en chatons pendants (4-6 cm), femelles en chatons plus petits 1-1,5 cm ; fr (akènes) à la base d'une bractée (cupule) foliacée à 3 lobes
	Cotonéaster à feuilles entières <i>Cotoneaster integerrimus</i> fam. Rosacées (FH 1057) 	fe ovales (1,5-3 cm), mucronées, tomenteuses grisâtres dessous ; fl roses, par 3-5 en corymbes rabattus vers le bas après floraison ; fr (piridions ?) rouges, à 2-5 noyaux (non comestibles, suspects)
	Cotonéaster tomenteux Cotonéaster laineux <i>Cotoneaster tomentosa</i> fam. Rosacées (FH 1058) 	fe suborbiculaires (3-6 cm), blanches et cotonneuses dessous ; fl rougeâtres, par 3-12 en corymbes toujours dressés ; fr (piridions ?) rouges, velus-tomenteux, à 2-3 noyaux (non comestibles)
	Epine noire Prunellier <i>Prunus spinosa</i> fam. Rosacées (FH 1065) 	ra brun noir très épineux, fe lancéolées-ovales (1,5-3 cm), fl blanches, paraissant (avant les feuilles, fr (drupes) bleu noir pruneux, acides, plus doux après le gel (comestibles)
	Epine-vinette Vinettier <i>Berberis vulgaris</i> fam. Berbéridacées (FH 213) 	ra épineux par la présence de feuilles réduites en épines triples ; fe obovales groupées en bouquets ; fl jaunes en grappes pendantes ; fr (baies) allongés rouges (comestibles, acidulés)
	Faux merisier Bois de Sainte-Lucie <i>Prunus mahaleb</i> fam. Rosacées (FH 1075) 	tr tortueux ; fe largement ovales (4-6 cm), un peu coriaces, pliées au niveau de la nervure centrale ; fl blanches par 4-8 en corymbes dressés ; fr (drupes), rouges puis noirs (comestibles, amers)
	Hêtre Foyard, Fayard <i>Fagus sylvatica</i> fam. Fagacées (FH 245) 	éc grise et lisse ; bo fusiformes pointus (2 cm) ; fe ovales ; fl mâles en chatons globuleux, femelles par 2 dans une capsule verdâtre ; fr (akènes) trigones par 3-4 dans une cupule ligneuse (faîne)




	Merisier à grappes Bois puant <i>Prunus padus</i> fam. Rosacées (FH 1073) 	ra (jeunes) à forte odeur fétide ; fe ovales (6-10 cm) ; fl blanches, odorantes, en grappes dressées puis pendantes ; fr (drupes) noirs (comestibles, aigres-doux, graines au goût d'amande amère)
	Nerprun des Alpes <i>Rhamnus alpina</i> fam. Rhamnacées (FH 1338) 	fe ovales (6-12 cm), à 10-15(20) paires de nervures, saillantes dessous ; fl en général mâles ou femelles, vert jaunâtre, à 4(5) pétales ; fr (drupes) verts puis noirs, à 3 noyaux (non comestibles)
	Nerprun purgatif <i>Rhamnus cathartica</i> fam. Rhamnacées (FH 1337) 	ra svt terminé par une épine ; fe presque opposées, ovales (3-7 cm), à 3-4 paires de nervures convergentes ; fl en général mâles ou femelles, vert jaunâtre, à 4(5) pétales ; fr (drupes) noirs (suspects)
	Noisetier Coudrier <i>Corylus avellana</i> fam. Corylacées (FH 260) 	fe suborbiculaires (5-12 cm), en coeur à la base ; fl mâles en chatons pendants, femelles réduites à des stigmates rouges dépassant d'un bourgeon, fr (nucules) dans 1 cupule foliacée (noisettes)
	Orme champêtre Ormeau <i>Ulmus minor</i> fam. Ulmacées (FH 270) 	ra (jeunes) parfois avec crêtes liégeuses ; fe ovales (8-10 cm), asymétriques à la base ; fl rouges, réduites au pistil et aux étamines (avant les feuilles) ; fr (akènes) ailés, près de l'échancrure
	Orme de montagne Orme rude <i>Ulmus glabra</i> fam. Ulmacées (FH 269) 	bo brun foncé, à poils ± rouges ; fe ob-ovales (9-15 cm), svt à 2 dents latérales, rudes, peu ou pas asymétriques ; fl sans pétales, en bouquets sessiles ; fr (akènes) ailés, situés au centre de l'aile
	Peuplier noir <i>Populus nigra</i> fam. Salicacées (FH 603) (P. d'Italie=ssp., seul.mâle, cultivé) 	bo visqueux ; fe triangulaires-ovales (5-9 cm) ; fl en chatons pendants, les mâles rouge violacé sessiles, les femelles vert jaunâtre pédonculées ; fr (capsules) glabres, à graines cotonneuses
	Poirier sauvage <i>Pyrus pyrastrer</i> fam Rosacées (FH 1041) (Poiriers cultivés=sans épines) 	ra souvent terminés par une épine ; fe ovales-elliptiques (3-7 cm), pétiole et limbe ± égaux ; fl blanches, ± rose pourpre à l'extérieur ; fr (piridions) acides et pierreux (impropres à la consommation)
	Saule blanc <i>Salix alba</i> fam. Salicacées (FH 577) (le + grand de nos Saules=5-25 m) 	bo velus, fe lancéolées effilées (5-8 cm), velues-soyeuses dessous, à poils appliqués, fl en chatons unisexués sur pieds séparés (espèce dioïque), fr (capsules) glabres
	Saule cendré <i>Salix cinerea</i> fam. Salicacées (FH 598) 	ra de 2-4 ans striés sous l'écorce ; fe lancéolées (5-12 cm), cendrées tomenteuses et nervures saillantes dessous ; fl en chatons unisexués ; ét orange rouge avt la floraison ; fr (capsules) tomenteux

	Saule drapé <i>Salix elaeagnos</i> fam. Salicacées (FH 579) (<i>S. vanniers</i> =fe 8-15 cm, soyeuses)		fe linéaires (6-12 cm), grises à blanches et tomenteuses dessous, à bords plus ou moins enroulés ; fl en chatons unisexués ; ét jaunes ; fr (capsules) glabres
	Saule noircissant <i>Salix myrsinifolia</i> fam. Salicacées (FH 593)		ra striés sous l'écorce ; fe ovales à elliptiques (3-9 cm), pruneuses dessous à pointe généralement verte, noircissant à la dessiccation ; fl en chatons unisexués ; ét jaunes ; fr (capsules) glabres
	Saule pourpre Osier rouge <i>Salix purpurea</i> fam. Salicacées (FH 585)		ra souvent pourpres ; fe subopposées, lancéolées (4-12 cm), glabres, glauques dessous ; fl en chatons unisexués, ét rouges, totalement soudées par 2 ; fr (capsules) tomenteux
	Saule marsault Saule des chèvres <i>Salix caprea</i> fam. Salicacées (FH 597)		éc ponctuée de petites crevasses en losanges ; ra non strié sous l'écorce ; fe ± largement elliptiques, à pointe inclinée ; fl en chatons unisexués ; ét jaunes ; fr (capsules) tomenteux
	Tilleul à larges feuilles T. à grandes feuilles <i>Tilia platyphyllos</i> fam. Tiliacées (FH 506)		fe suborbiculaires (10-15 cm), souples, parfois asymétriques, touffes de poils blanchâtres dessous ; fl par 2-5 en corymbes pédonculés sur une bractée foliacée ; fr (nucules) à 4-5 côtes saillantes
	Tilleul à petites feuilles <i>Tilia cordata</i> fam. Tiliacées (FH 508)		fe suborbiculaires (3-8 cm), rigides, ± asymétriques, glauques et touffes de poils roux dessous ; fl par 3-10 en corymbes pédonculés sur une bractée foliacée ; fr (nucules) à 2-3 côtes peu saillantes
	Tremble <i>Populus tremula</i> fam. Salicacées (FH 601)		éc à lenticelles en losanges ; fe suborbiculaires, crénelées, à long pétiole aplati ; fl en chatons unisexués sur arbres séparés (dioïque) ; fr (capsules) glabres, graines cotonneuses


D



	Alisier torminal Sorbier torminal <i>Sorbus torminalis</i> fam. Rosacées (FH 1050)		fe à 5-7 lobes aigus, inégaux ; fl blanches en corymbes ; fr (piridions) jaune rougeâtre, puis bruns et verruqueux à maturité (alises, comestibles, mais coriaces et acides)
	Aubépine à un style Epine blanche <i>Crataegus monogyna</i> fam. Rosacées (FH 1054)		ra épineux ; fe à pétiole pubescent, à 3-5 lobes profondément incisés, nervures divergentes ; fl blanches à 1 seul pistil, floraison mai-juin ; fr (piridions) rouges, à 1 noyau (cenelles, comestibles)
	Aubépine épineuse Epine blanche <i>Crataegus laevigata</i> fam. Rosacées (FH 1053)		ra épineux ; fe à pétiole glabre, à 3-5 lobes arrondis peu découpés, nervures convergentes ; fl blanches à 2(3) pistils, floraison avril-mai ; fr (piridions) rouges, à 2(3) noyaux (cenelles, comestibles)


	Chêne pédonculé Chêne rouvre <i>Quercus robur</i> fam. Fagacées (FH 249)		fe à court pétiole, pourvues d'oreillettes à la base; fl mâles en chatons pendants, femelles en petits bourgeons pédonculés; fr (nucules) portés par une cupule, isolés sur un long pédoncule (glands)
	Chêne sessile Chêne noir, Ch. truffier <i>Quercus petraea</i> fam. Fagacées (FH 250)		fe nettement pétiolées, en coin à la base; fl mâles en chatons pendants, femelles minuscules, sessiles, à la base des feuilles; fr (nucules) portés par une cupule, sessiles, groupés par 2-5 (glands)
	Groseillier des Alpes <i>Ribes alpinum</i> fam. Grossulariacées (FH 853)		fe petites (2-4 cm), à 3-5 lobes; fl en grappes dressées verdâtre jaunâtre, généralement unisexuées, les mâles par 10-30, les femelles par 2-5; fr (baies) en grappes ± dressées (comestibles, fades)
	Groseillier des rochers <i>Ribes petraeum</i> fam. Grossulariacées (FH 854)		fe grandes (5-15 cm), à 3-5 lobes aigus; fl hermaphrodites verdâtres à rougeâtres, en longues grappes dressées puis pendantes; fr (baies) rouges (comestibles, saveur acidulée)
	Peuplier blanc <i>Populus alba</i> fam. Salicacées (FH 602)		éc (jeune) blanc grisâtre, à grosses lenticelles en losanges; fe crénelées-lobées (6-12 cm), vert sombre dessus, blanche tomenteuse dessous; fl en chatons unisexués (dioïque); fr (capsules) glabres


E










	Frêne commun <i>Fraxinus excelsior</i> fam. Oléacées (FH 1730)		bo noirs, globuleux; fe imparipennées, à 4-6 paires de folioles lancéolées; fl sans calice ni corolle, uni-ou bisexuées, en bouquets ± noirâtre, avant les feuilles; fr (akène) ailé, persistant l'hiver
	Sureau à grappes Sureau rouge <i>Sambucus racemosa</i> fam. Caprifoliacées (FH 1971)		fe imparipennées, à 1-3 paires de folioles lancéolées; fl jaune verdâtre en grappes dressées; fr (baies ou drupes ?) rouges (toxiques par les graines, mais pulpe comestible)
	Sureau noir Grand sureau <i>Sambucus nigra</i> fam. Caprifoliacées (FH 1969)		fe imparipennées, à 2-3 paires de folioles ovales-lancéolées; fl blanchâtres en corymbes terminaux ± penchés; fr (baies ou drupes ?) noirs (comestibles bien mûrs)

F



	Cytise des Alpes Aubours des Alpes <i>Laburnum alpinum</i> fam. Fabacées (Papilion.) (FH 1094)		ra (jeunes) glabres; fe à 3 folioles ovales-lancéolées, vertes sur les 2 faces; fl jaunes (14-17 mm) en grappes pendantes; fr (gousses) glabres (3-5 cm), luisants, à suture supérieure ailée
---	--	---	---

	Cytise faux ébénier Aubours faux anagyris <i>Laburnum anagyroides</i> fam. Fabacées (Papilion.) (FH 1093)		ra (jeunes) velus ; fe à 3 folioles ovales-lancéolées, glauques et velues dessous ; fl jaunes (18-22 mm) en grappes pendantes ; fr (gousses) velus (4-8 cm), à suture supérieure épaissie
	Eglantier Rosier des chiens <i>Rosa canina</i> fam. Rosacées (FH 1013)		ra à aiguillons très robustes ; fe imparipennées, à 2-3 paires de folioles ± ovales ; fl rose pâle, à sépales divisés, rabattus ; fr (akènes) dans un faux-fruit ovoïde rouge (cynorrhodons, comestibl.)
	Hippocrévide émérus Coronille émérus, C. arbrisseau <i>Hippocrepis emerus</i> fam. Fabacées (Papilionacées) (FH 1163)		ra secondaires anguleux ; fe imparipennées à 2-4 paires de folioles ovales, glauques ; fl jaunes groupées par 2-3 en petites grappes pédonculées ; fr (gousses) très minces (5-10 cm)
	Robinier faux acacia <i>Robinia pseudoacacia</i> fam. Fabacées (Papilion.) (FH 1162)		ra épineux (stipules transformées) ; fe imparipennées à 5-10 paires de folioles ovales, molles ; fl blanches en grappes pendantes ; fr (gousses) plates, glabres, gris noirâtre (4-10 cm)
	Rosier des Alpes <i>Rosa pendulina</i> fam. Rosacées (FH 997)		ra à aiguillons épars ou absents ; fe imparipennées à 3-5 paires de folioles oblongues-ovales ; fl rouge carmin, à sépales entiers, dressés ; fr (akènes) dans un faux-fruit allongé, penché
	Sorbier des oiseleurs <i>Sorbus aucuparia</i> fam. Rosacées (FH 1047)		fe imparipennées à 4-9 paires de folioles lancéolées dentées ; fl blanches en corymbes terminaux ; fr (piridions) rouges, ± persistant l'hiver (non comestibles, amers et farineux)

Attention !

Ne figurent pas sur cette liste, à part bien entendu les Conifères (voir fiche «Conifères»), les espèces suivantes :

-les arbres bien connus et également cultivés : Houx, Marronnier, Noyer, Platane...

-les arbres rares dans le JNV : Amélanchier, Bouleau pubescent, Bouleau nain, Cornouiller mâle, Daphné des bois, Néflier, quelques Saules et Rosiers...

-les arbres cultivés qui s'émancipent peu à peu : Laurier-cerise, Sumac, Ailantes...

Définitions :

-**aiguillon** : piquant d'origine épidermique se détachant en laissant une cicatrice superficielle

-**baie ou drupe** ? : fruits dont la nature complexe n'est pas encore bien définie

-**dioïque** : fleurs mâles et fleurs femelles séparées, sur 2 arbres différents (Peupliers, Saules)

-**épine** : piquant né de la transformation d'un rameau, d'une feuille, de stipules ou d'un bourgeon

-**hermaphrodite** : qualifie les fleurs porteuses de gamètes mâles (étamines) et femelles (pistil)

-**imparipennée** : feuille pennée terminée par une foliole

-**monoïque** : fleurs mâles et femelles séparées, sur un même arbre (Bouleau, Aulne, Charme, Chêne, Noisetier...)

-**piridion** : fruit composé souvent considéré comme intermédiaire entre baie et drupe (voir fiche «Types de fruits»)

-**sessile** : feuille sans pétiole et fruit sans pédoncule qui s'insèrent directement sur le rameau

Abréviations :

tr=tronc, éc=écorce, ét=étamine, ra=rameau, bo=bourgeon, fe=feuille, fl=fleur, fr=fruit

FH = FLORA HELVETICA 2000

02.2013

H. Ceppi